

Nova zdravila pomagajo bolnikom živeti dlje in bolj zdravo

Nova zdravila omogočajo zdravljenje številnih vrst raka, zmanjšujejo posledice bolezni srca in ožilja, ponujajo nove možnosti bolnikom z obolenji, ki jih je težko zdraviti, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, delujejo pa tudi proti najredkejšim obolenjem. Nova zdravila pomagajo bolnikom živeti dlje in bolj zdravo.

Podaljševanje življenjske dobe in zmanjševanje prizadetosti

Od leta 1950 se je življenjska doba za moške in ženske v ZDA podaljšala za celo desetletje, z **68,2** na **78,2**. V Sloveniji se je življenjska doba samo od leta 1987 do 2009 podaljšala iz **72,1** na **79 let**. Raziskovalci v ZDA poročajo, da so zdravila in drugi načini za zdravljenje bolezni srca in ožilja za **50 %** povečali možnost, da starejši bolnik brez hujših posledic preživi srčno ali možgansko kap.

Bolezen	Uspeh novih zdravil	Prej	Potem
Rak	Od leta 1980 se je življenjska doba za rakave bolnike podaljšala za približno 3 leta , od česar 83 % lahko pripišemo novim načinom zdravljenja, vključno z zdravili. Med letoma 2003 in 2007 se je umrljivost zmanjšala v povprečju za 1,6 % na leto . Možnost, da bolnik z rakom preživi vsaj 5 let, se je na splošno pri različnih vrstah raka povečala za 36 % .	Leta 1975 je bilo petletno preživetje 49 % .	Do leta 2003 se je petletno preživetje povzpelo na 67 % .
Bolezni srca in ožilja	Umrljivost pri boleznih srca in ožilja je med letoma 1997 in 2007 upadla za dramatičnih 28 % . Nova zdravila pri boleznih srca in ožilja prispevajo k boljšim izidom zdravljenja: boljši nadzor dejavnikov tveganja, zgodnejše odkrivanje ter boljše zdravljenje in oskrba . Umrljivost zaradi srčne odpovedi in srčne kapi se je v letih 1999-2005 skoraj prepolovila . Zdravila proti povišanemu srčnemu tlaku rešujejo življenja in preprečujejo potrebo po zdravljenju v bolnišnici. Kljub naraščajoči debelosti je bil dosežen mejnik pri nadzoru povišanih krvnih maščob.	Umrljivost bolnikov s srčno kapjo v bolnišnicah je bila leta 1999 8,4 % . Leta 1999 se je srčno popuščanje azvilo pri 19,5 % bolnikov s prebolelo srčno kapjo.	Leta 2005 je bila umrljivost bolnikov s srčnokapjo v bolnišnicah 4,6 % . Leta 2005 se je srčno popuščanje zvilo pri 11 % bolnikov s prebolelo srčno kapjo.
	Življenje z virusom HIV/AIDS-om se je dramatično spremenilo. Zdravljenje	Preživetje je bilo le nekaj	Od odobritve protivirusnih

HIV/AIDS	okužbe s HIV s protivirusnimi zdravili je smrtno bolezen večinoma spremenilo v kronično. Novoodkriti bolniki imajo danes na voljo številne možnosti zdravljenja, vključujoč različne kombinacije zdravil, ki jih ohranjajo dolga leta brez bolezenskih težav. Delno zahvaljujoč stalnim napredkom pri zdravljenju, umrljivost zaradi virusa HIV stalno pada. Upadlo je tudi število sprejemov v bolnišnico. Bolnik z virusom HIV danes živi 15 let dlje, kot bi v osemdesetih letih. Uporaba zdravil proti HIV-u pomaga tudi preprečevati širjenje virusa.	mesecev, s številnimi dodatnimi okužbami. Edina zdravila, ki so bila na voljo, je bilo treba jemati na štiri ure – neprestano – in je imelo resne neželene učinke.	zdravil (ART) leta 1995 je umrljivost zaradi AIDS-a upadla za 78 %. Pričakovana življenjska doba določenih posameznikov, okuženih z virusom HIV, se približuje življenjski dobi neokuženih.
Sladkorna bolezen	Na voljo so različna učinkovita zdravila. Zaradi izboljšane uporabe zdravil je potreba po bolnišničnem zdravljenju prepolovljena. Manjša verjetnost je, da bodo bolniki s sladkorno boleznijo potrebovali bolnišnično in nujno oskrbo. Manjša verjetnost je, da se bodo pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z zdravili, razvile druge zdravstvene težave.	Umrljivost zaradi sladkorne bolezni je leta 2009 padla za 4 %.	V zadnjih letih je dovoljenje dobilo 8 novih vrst zdravil za sladkorno bolezen, kar je dalo bolnikom in zdravnikom nov a močna orodja za zdravljenje bolezni.
Revmatoidni artritis	Nova vrsta protirevmatičnih zdravil danes dramatično upočasnjuje napredovanje bolezni.	Še pred 20 leti je revmatoidni artritis (RA) veljal za neustavljivo napredujočo bolezen. Zdravljenje je dajalo le malo upanja, da bi se dolgoročni izid bolezni bistveno spremenil.	Bolniki, zdravljeni s kombinacijo novih in starih zdravil, imajo po 52 tednih zdravljenja 50-odstotno možnost popolnega prenehanja bolezenskih težav.
Osteoporoza	Zdravila proti osteoporozi pri rednem jemanju bistveno zmanjšujejo tveganje za zlome kosti.		Bolniki, ki jemljejo zdravilo za osteoporozo, imajo 65 % manj zlomov.
Redke bolezni	Od sprejema Zakona o zdravilih sirotah leta 1983 je bilo odobrenih 369		Nove možnosti zdravljenja redkih

	zdravil za zdravljenje redkih bolezni.		bolezni dajejo novo upanje bolnikom, ki so imeli le malo obstojećih možnosti zdravljenja.
--	---	--	---

Podatki v tabeli veljajo za ZDA.